#### **SÍNTOMAS COVID-19**

- Fiebre sobre 37°
- Tos seca
- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Dolor de garganta
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Pérdida del olfato o del gusto
- Vómitos
- Diarrea





Este proyecto se realiza gracias a la adjudicación de fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), para la realización de proyectos en temáticas asociadas a la pandemia de Covid-19 (proyecto COVID 0589)

Si tiene alguna pregunta sobre el estudio puede contactarse con el equipo investigador al teléfono: 562 23279509 de lunes a viernes de 8.30 a 17.00 horas, o al mail seroprevalencia@udd.cl

#### MÁS INFORMACIÓN:



https://medicina.udd.cl/ estudioseroprevalencia/







# MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19



# MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA COVID-19



### LÁVESE LAS MANOS **FRECUENTEMENTE**



# **MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL**



## SI TIENE FIEBRE, TOS Y **DIFICULTAD PARA RESPIRAR**, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA



Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol (alcohol gel).



Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas. Evite contacto con personas que tosan, estornuden o tengan fiebre.



Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, debe aislarse inmediato para evitar contagiar a otros. Busque atención médica, ya aue dichos síntomas pueden infección deberse а una respiratoria.



#### ADOPTE MEDIDAS DE HIGIENE **RESPIRATORIA**



#### **EVITE TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA**



Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas. puede transferir el virus de la superficie a sí mismo.



# **INFORMESE Y SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS**



conseios Siga los de establecimiento de salud, de las autoridades sanitarias a nivel nacional y local sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19.



Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; elimine el pañuelo inmediatamente v lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.